


秘傳眼科全書

秘傳眼科全書卷之五

硬臉硬睛外障



硬臉硬睛者胞臉睛珠俱木痛澁難開
肝膈間積熱肝臟風壅氣血凝滯睛臉
堅硬血旺氣虛肥膩之人或飲酒大腸
堅積多受是症先患一眼後乃相牽俱
損漸生翳膜治法初發者宜用摩風膏
摩去風邪散運血氣或煎生地黃當歸
鬚赤芍川芎防風白芷羌活薰洗一日
三度宜隔肝膈之熱熱以時藥若積年
久腫有瘀血宜剝洗黑睛有翳有膜可

吹可點但此眼初患者多久患者少宜服歸肝散當

歸活血陽洗肝散

歸肝散 方載前禾行赤眼外障條

當歸活血陽 方載前被物撞破外障條


洗肝散 當歸 川芎 梔子 防風

羌活 薄荷 甘艸 大黃 隋石

眼有血流加朴硝胞腫加桑白皮

右為細末每服二錢溫湯泡下

白陷魚鱗外障



白陷魚鱗者肝肺二經積熱充壅攻上致黑睛遂生白翳如魚鱗鋪砌之狀或如棗花中有白陷發歇不時或發或聚疼痛自出然婦人多生此疾何也苦樂不由已出七情鬱結不舒毒壅於肝肝者血之室也婦人以血為主血傷則肝風黑仁風輪多生是翳甚至白陷衝入黃仁引血相援漸成大患額腦兼痛用摩頂膏摩擦封貼於額頂痛處用陰二陽四丹吹點或用青鹽黃泥固濟包煨

熟研末以鴨卵醺點于魚鱗中每日一次亦能除此

賢宜服知母飲酒調散摩頂膏

知母飲 知母 充蔚子 防風 赤芍

青相子 黃芩 大黃酒洗 桔梗 桑白

茯苓 細辛 或加朴硝

右水煎半饑溫服


酒調散 當歸 川芎 赤芍 黃芩

梔子 木通 防風 龍膽州 大黃

研為細末老酒調下

摩頂膏 子鵝脂 牛脂 木香各一兩 塩花二兩

水蝦醫翳障外



硃砂錢 龍腦分

右以四味為末用鵝牛脂熬滾入前藥末熬成膏若軟入黃蠟多少要用手蘸摩標頭額諸痛處或開紙貼痛處亦可

水蝦醫翳者黑睛上翳如水蝦形狀因而名曰水蝦也大抵與白陷魚鱗同症亦因肺經有熱肝經受風致令黑睛生白翳形如水蝦之狀微小占在眼之風輪黑睛含糊攢眇填粘于翳之低處開時赤澁淚出眇滿朦蔽瞳仁一動

如鼻淵或黃或白看則如膜遮障一般醮却又生月
久至損眼發歇來往治法用陰二陽四丹一夜吹一
次稍退宜點清晨用菊花側柏冬青葉黃連歸鬚桑
白之類煎湯日洗二三度服藥除根宜服充蔚子散
人參湯清涼湯

充蔚子散 方載前檉刺生翳外障條

人參湯

人參

白朮

桔梗

五味

大黃

車前子

玄參

黃芩

知母

桑白

右白朮水煎食後服

清涼散

蔓荊子

薄荷

防風

荊芥

梔子

苦竹葉

耳艸

青柏子


細辛

桔梗

前胡

右白朮煎食後服

玉翳浮滿外障



玉翳浮滿者風衝入眼積熱肝臟發歇
疼痛失於調理日久累積血凝不散結
成白翳遮滿瞳仁如玉五色相似故立
名玉翳浮滿如此之狀有退有進有紅
有淚發歇不定治法用陰三陽二丹藥
吹點眼淚帶藥汪々流出如此之狀其

醫必能漸收寒濕如磨鏡塵垢去蓋明必復矣若
發年久無進無退不紅不痛縱有丹藥之驗刀針之
利終無措手之處宜墜翳洗肝撥雲之劑服之宜服
墜翳散洗肝散撥雲散

墜翳散

車前子

青柏子

蒺藜

木賊

蟬退

石決明

州決明

黃芩

玄參

防風

細辛

大黃

右白水洗食後服

洗肝散

方載前硬臉硬睛外障條

撥雲散


黃連

黃芩

白芍


菊花

赤膜下垂外障



赤膜下垂者三焦炎上胞屬胃陽明經
 壅熱血運至此凡滯不行不時眼澁淚
 出故生赤膜下垂漸久而長直覆睛珠
 牽引瞳仁翳如紅霞之色治法不宜鈎
 割須用除三陽四丹藥一夜吹一次點
 一次漸消磨若翳停厚色淡有淚者
 吹之易退翳實如紅霞薄而無淚吹之
 難退宜用瀉火退血之藥服之方能取
 効大抵此翳與逆順生翳理同宜服羚
 羊角飲大黃當歸散酒散聖翳丸

障外衝上膜黃



羚羊角飲

方載前棗花內障條

大黃當歸散

方載前血障瞳仁外障條

酒調散

方載前白睛魚鱗外障條

墜翳丸

方載前白睛黃心內障條

黃膜上衝者此脾胃風熱氣滯膏脂塞
血運不能流通故生是翳發歇無時痛
縱淚出漸生黃膜上衝發則膜舒退則
膜捲胞皮下垂羞明怕日雖舉不拆黃
膜漸長遮滿瞳仁甚至滿目皆黃難辨
人物治法雖不是拳毛倒睫之症亦可

夫去些眼皮膚毛使露黑睛養眼氣舒發歌年久者
可夾下發者不宜夾治法宜通脾瀉胃撥雲八正之
劑點以對交之丹片腦少許如有淚退之速無淚退
之遲宜忌口齋戒使衰其血易于調治也又有一症
黃膜下垂與上衝大抵治同宜服通脾瀉胃散撥雲
散八正散

通脾瀉胃散

麥門冬 克蔚子 防風

大黃

知母各一兩

天門冬 黃芩 石膏

黃柏

州決明


甘肅

熟甚加朴硝

石白水仙食後服

撥雲散 方載前王翳浮繭外障條

逆順生翳外障



逆順生翳者與赤膜下垂黃膜上衝之症頗同但逆順者五臟虛勞風熱衝于肝膈上胞陽明經壅熱血氣凝滯故生赤膜下垂下為之垂簾翳此為順下臉太陰脾經毒壅故翳膜下生向上為之逆翳治法宜瀉脾胃之劑大抵去翳之藥有輕重增減宜忌口諸毒宜服知母飲瀉肝散車前散補虛人參丸

知母飲 知母 充蔚子 車前子

桔梗

大黃

薺苳

五味

右白朮煎食後服

傷肝散

方載前天行赤眼外障條

車前散

車前子

州決明

密蒙花

白蒺藜

龍膽州

羌活

菊花

薺苳

其州

黃柏

前胡

細辛

右研細末每服二錢食後米飲調下

補虛人參丸

人參

白朮

熟地

山藥

防風

桔梗

木香

細辛

桂心


石解州

黃柏

厚朴

州決明

漏睛膿血



兔絲子兩 覆盆子各 牛膝

方參 當歸

川芎

各下兩

右研細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服三十九空，心酒下，或白湯下。

漏睛膿血者，有甚于釘翳并膜入水輪二症之利害。此症未發之時，其頭先昏，悶四肢如勞，五臟多積風熱，壅毒致衝于黑睛，黃仁生出，毒瘡潰，水輪流血，爛流清，流膿，治法宜慈，又入白芷，錫中炒熟，以綿裹熨眼胞上，屢換熱的散。

其惡血消其敗膿止其惡痛生地黃湯燭煨炙有瘡處更妙或用陰二陽四丹藥對有瘡處吹或單用枯礬輕粉血竭乳香研細對瘡處吹點亦可薰洗用桑白塩花明礬薰洗忌食動風動血物服宜治風黃芪湯沒藥散竹葉湯肝散明目丸

治風黃芪湯

黃芪

防風

遠志

人參

白朮

地骨皮

知母

大黃

熟地黃

麥門冬

右內水煎食後稍熱服

沒藥散

方載前血灌腫仁外障

眼科

卷五

竹葉瀉肝散

淡竹

桑胡

杭子

甘艸炙

羌活

升麻

赤芍

州決明

白朮

澤瀉

各五分

車前子

黃芩

黃連

大黃


酒洗各七分

右白_三水煎食後熱服

墜血明目丸

方載前血灌瞳仁外障條

飛塵入眼



飛塵入眼者此症全然無事誤被物或
飛塵或飛絲入眼此外傷也只因塵物
粘在胞臉之間粘定不出痛澁難開破
縫淚出以致障膜初患之時治法用絲
綿纏針翻轉上下胞臉抽撥出塵物即

可若初時不識此療，日久必生翳膜，遮滿瞳仁，須用丹藥吹點，胞臉肉仔細翻轉，看有物粘處，必定有血積成塊，或肉有疙瘩，此是病之發處，宜用小鋒針抽撥，或針出血，則除病根，宜服退翳車前散糖煎散，補肝丸。

退翳車前散

車前子

五味子

赤芍

細辛

玄參

白朮

人參

大黃

細茶

桔梗

等分，白木煎食後服。

糖煎散

當歸

赤芍

川芎

防風

防已

甘州

荆芥

龍膽州

山烏豆

大黃

研為末テレ每服四錢砂糖一ト塊白ハ水ヲ同煎服ス

補肝丸

人參ヲ

白朮

熟地

山藥

遠志

知母

澤瀉

防風各ト兩

楮實子酒ヲ洗

鬼絲子酒ヲ煮

葵梨炒テ乾ス

當歸酒ヲ洗ス

石菖蒲

夏枯州

石斛州各ト錢

覆盆子酒ヲ洗

蔓荊子

龍膽州


細辛

川芎各ト錢

右研細末煉蜜為丸ト如梧子大每服三十丸空

心白湯下或酒下ス

奪毛倒睫外障



奪毛倒睫者此肺經受損肺者五臟之
 華蓋生一身之皮毛肺損則皮聚而毛
 落也有因勞倦思慮太過大抵致令肝
 家受熱膈內風虛痛眩不時淚出脾氣
 下陷怕日羞明乍好乍惡以手摩引致
 令睫毛倒入刺眼礙視瞳仁漸生翳膜
 敵頭側視不能正觀治法須用竹夾
 起眼皮睫毛使生外向其疼痛去睛中
 有翳用清涼丹或八寶膏吹點翳即消
 落其夾須依口訣務宜緊夾不可以漏

水漬有宛痕若胞下瘡處用光粉調香油塗早擦
久則肉色一般服目光明如舊宜服細辛湯防風飲
明目流氣飲補腎丸

細辛湯

細辛

防風

知母

充蔚子

大黃

桔梗

羚羊角

玄參

為末水煎食後服

防風飲

人參

當歸

黃芪

甘州

防風

黃柏

蔓荊子

細辛

用白水煎食後溫服須避風忌口

明目流氣飲

大黃

川芎

亭陸子

菊華

防風

荊芥

玄參

蒺藜炒去

細辛

黃芩

梔子

州決明炒

木賊

甘州

蒼朮


蔓荊子

右研細末每服二錢臨卧時飲湯調下或酒調下

補腎丸

方載前偃月內障條

克風淚出外障



充風淚出者治非一也有腎水虛不生肝木木生風風揉而木動此是肝虛而風入眼故淚出則不能攸其水傷燥故曰迎風而淚出也然淚非一端有冷有熱腫痛赤腫者此熱淚也若迎風淚出

汪公冬月多夏月少拭却還生翳日久不分春夏秋
冬皆有冷淚也治法熱淚者點藥去之冷淚者用乳
香川烏丸川烏一箇州烏二箇去皮明礬一錢白
酒麴一團共為末棕豬膽一箇用汁為丸如黍米大
每夜卧用一丸放於眼大背頭後即止或灸止之
又有肺臟久冷大背有孔名為淚堂此淚雖久淚則
冷眼愈昏睛矣宜細辛飲平肝散暖風湯荆枯湯煖
肝丸

細辛湯

細辛

防風

充蔚子

藁本

知母

黃芩

川芎

五味子

熟地

白朮

地骨皮

菊花

木賊

各一兩

右研為末，每服二錢，清茶調下。

平肝散

歸鬚

赤芍

川芎

白芷

防風

荊芥

羌活

蔓荊子

柴胡

蟬退

各五分

龍膽艸

生地

各八分

甘州

二分

夏枯艸

各一兩

白朮煎起，投加酒一盞，食後服。

煖風湯

細辛

五味子

防風

充蔚子

藥本

知母

黃芩

川芎

龍膽艸

木賊

蔓荊子

蒼朮

夏枯艸

香附

白朮煎食後服。

荆枯湯

蔓荊子

夏枯艸

蒼朮

香附

其菊

羌活

密蒙花

玄參

當歸

防風

木賊

細辛

陳皮

右各等分水煎食後服

煖肝丸

細辛

藁本

知母

川芎

夏枯艸

猪實子

鬼絲子

防風

當歸洗七

黃葵

石解艸

艸決明

龍膽艸

白芍

枸杞

玄參各一

五味子

蔓荊子

黃柏各七

牛膝

熟地黃

充蔚子


白茯苓各一

川芎五

石研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十丸食

後自湯下

肝風積熱障外



肝風積熱者肝家勞苦七情鬱結二三年間來往一發一歇遂生翳或聚或散赤澁淚出此疾多是夜勤灯火或觀書或雕畫或造器細巧之人久累肝家積熱成風肝若受風必有腦痛不覺漸昏朦治法有翳者吹以丹藥內服既肝省風之劑除肝家之風熱其薰洗照依疼痛腫翳眼之藥方載前症條下宜忌口保養

洗肝散

當歸

羌活

薄荷

梔子仁

大黃

防風

甘州

川芎


家傳加龍膽、艸、生、地、黃

右研為末，每服三錢，白湯調服，或煎服。

省風湯

方載前，沉、翳、障、障、條

起坐生花



起坐生花者，此症是內障條移在外障中，誤也。此症由肝血衰、膽腎二經虛也。六陽不舉，久坐傷血，起則頭暈，眼前常見花發數般，或赤或黑，或白，撩亂昏暗，不明良久，乃定。瞳仁開大，不睛不痺，不

痛無眩無候皆因肝腎虛敗氣不充周以致視如無
見此真氣血不足水木不榮者也治法宜補肝腎或
明目固本丸不治恐久變為青盲內障或變為五風
難治之症則無及矣宜服固本丸補肝散補腎丸

固本丸

人參

生地黃

天門冬

麥門冬

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸空
心塩湯送下


補肝丸

方載前便月內障條

補腎丸

方載前圓翳內障條

肝風目瞤外障



肝風目瞤者乃是肝腎虛勞肝氣不足
 血虛故也不時疼痛舉發無時痛則如
 眼珠墜頗有赤澁淚出看物依稀前見
 花發數般或黃或黑或白見一物如見
 形狀此實有相兼之病若不諳療誠恐
 損眼治法非徒治外當先治內則服
 蒺藜散補肝丸外則用陰二陽八丹藥
 調乳汁點二三夜點一次肝腦少許和
 洗以生地黃菊花赤芍側柏葉秦皮白
 芷川芎須忌口五年諸熱物宜服白蒺

止或濕痺用碧天丹洗清晨以塩湯洗或桑白皮防
風荆芥煎湯洗宜烏蛇湯祛風一字散補膽丸點洗
八寶膏碧天丹

烏蛇湯

烏蛇

桑木

川芎

防風

赤芍

羌活

右研為末白水煎食後服

祛風一字散

防風

荆芥

柴胡

艸烏

羌活

右研細末每服二錢薄荷湯調下

補膽丸

人參

柴胡

白朮

枳實

前胡

馬兜鈴

細辛

玄參

枸杞

熟地

牛膝

當歸

赤芍

川芎

右研為細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服五十丸，食後酒送下。


八寶膏

方載後，點眼，丹膏條下。

碧天丹

方載後，洗眼，要藥條下。

鵝眼凝睛外障



鵝眼凝睛者此驟然所感非久患之症
 因五臟皆受熱毒攻五輪振起堅硬不
 能轉運血氣凝滯非一而鵝鳥之眼
 凝視不運之貌難辨人物因形而名曰
 鵝鳥凝睛治法先以香油調桑汗於額
 臉部摩擦或頂上用摩風膏摩擦更妙
 服以酒煎散以被蓋出汗眼即活動此
 症多是小兒急慢驚風之症大人少有
 此疾宜服酒煎散溫膽湯搜風湯退熱
 飲

酒煎散

方載前異露赤眼生翳外障條

馮膽湯

防風

充膚子

黃芩

玄參

桔梗

朴硝

右白朮煎食後服

搜風湯

方載前旋螺突起外障條


退熱飲

方載前臉生風粟外障條

摩風膏

方載前風牽咽斜外障條

轉轆關外障



轉轆關者與鵝眼凝睛症同鵝眼凝睛者睛凝不運之貌轉轆關者黃仁受風變黑而縮中央瞳仁展開而大膽腎之水散為蓋瞳仁大小隨黃仁之展縮黃仁展則瞳仁小黃仁縮則瞳仁大
人不知以為瞳仁能大小者非也此乃肝經受風而不展轉轆則圓圓也隨肝輪而縮覺見瞳大而不敢說曰轉轆瞳仁展開風衝入腦眼帶吊起此症小兒急慢驚風多受之治法如前用養汁調


摩風膏，摩擦藥用，蚌蛤，頻下乳母忌口，但大人此患難有，宜服傷肝散，麥門冬湯，滋腎丸。

傷肝散 方載前，天行赤眼，外障條。

麥門冬湯 方載前，血虛瞳仁，外障條。

滋腎丸 方載前，烏風內障條。

小兒通睛外障



小兒通睛者，與鵝眼癰睛，轉轉開三症一同然。此症，被物打，着頭額，或跌着心，膽皆驚，風邪皆壅，至眼通睛。黃仁水輪皆黑，似無黃仁。此黃仁與瞳仁通混，不分號。曰通睛，亦用摩擦發散其風。

邪服牛黃丸不須點丹藥只宜服藥然前症鵝服與
轉輾此用牛黃丸通頂石南散亦可服也宜服牛黃
丸通頂石南散

牛黃丸

牛黃錢一

白附子

全蝎

川芎

石脂

白芷

藿香各半錢

硃砂錢三

肉桂錢二

麝香四分

右研細末煉蜜為丸如大豆大每服二三丸
臨卧薄荷湯調下

通頂石楠散


石楠

荊笋

瓜蒂

右研細末每服一錢米湯調兩度進之去風疾

小兒疹痘外障



小兒疹痘名為百歲瘡不論大人小兒
 頭患一度疹痘之眼症有兩般痘
 症者初上皮膚之際眼閉不開睛上生
 有痘瘡占在黑睛者易治急取益母州
 煎湯薰洗一日三度更以丹藥調鱈魚
 血點之忌口及夜啼哭乳母亦宜忌口
 頃疹痘痊其眼漸開眼中之痘亦隨而
 痊矣又有一症疹痘之後瘡疤落盡肌
 體肥壯眼肉忽然紅腫此乃餘毒鬱于
 肝發出此症十分為害急用車前州搗

蜜水頓下，喫下，隔却肝經毒熱，先以益母草煎，以藥
血調藥，治粉遲毒氣鬱結于肝，不能舒暢，發于眼目，
傷于瞳仁，無治法也。宜服涼膈散，密蒙花散，秦皮湯，
涼膈散 方載前，秦皮花內障條。


密蒙花散 密蒙花錢 青相子錢 州決明錢 車前子錢
右研細末，用羊肝一片，破開，搽藥末在內，仍合
之，濕紙數重包裹，煨熟，空心與食之。

秦皮湯 秦皮 秦艽 細辛 防風

耳艸各半錢

右白水洗眼，使渣不入眼。

小兒眼生翳障外



○一小兒痘疹未出之先用銀硃或胭脂浸水點眼及心窠喉嚨頸下免致痘疹侵之

○一小兒疹痘之後有目腫者用炒藥金彈子雪裡開磨水與飲或磨米泔水

○一小兒目內有痘疹者用初生鷄蛋調乳點眼妙

小兒眼生翳者脾胃實熱而發出以致臉生肉翳如粟如麻或有血塊又是膽中受毒或因乳母好食熱物皆能令兒患眼治法諒兒大小疾之遠近輕重一周半載者其藥須令母飲或用蚌殼蘸


下小兒飲若二三歲有此是胎毒也又離母之後患
眼者此是小兒自受之症也母無預此藥須令小兒
自飲忌食香膩炒煎糖果之類不獨患眼所忌如不
忌多生別疾變為疳傷亦能害目甚至不治之症其
海眼別有條欬此乃小兒生翳症也黑睛如麻大或
如蘿蔔花與海眼大不作宜服導赤散撥雲散除風
湯

導赤散 方載前大背赤麻穿睛外障條

撥雲散 方載前玉翳障外障條

除風湯 方載前臉生風粟外障條

小兒疳傷眼障



小兒疳傷眼者此富貴之家小兒多生是疾蓋由父母愛之所致也小兒如州之萌藥怎受風霜之欺且小兒五臟六腑未實血氣柔弱怎禁油膩煎炒諸般量腥或一週半載縱糖果之物及鵝鴨鷄豬羊牛等肉或食諱了又哺以乳或乳方飽又與以飯此出於父母之情富貴之家有此症貧賤之家豈有是患何也一食諸物不消化傷于脾胃至腹脹午後發熱至半夜方退日久頭髮稀疏

轉作洩瀉成痢頻以口渴致傷肝膽眼之白仁鮮紅
羞明怕日漸生翳膜遮滿黑珠或突起如黑豆如香
菰之狀治法先治內而後治外用雞蛋入輕粉一二
分史君子二箇半葱幾莖用濕紙包煨與食空心連
食五七蛋止又宜煮羊肝露一宿蘸夜明砂食或豬
肝亦可切宜忌口暈腥其白膜用陰一陽七丹藥調
乳點煎胡宣二連服後用側柏葉煎湯薰洗若痔傷
肝膽眼珠突出或睛進為不治之症不直睛甚至喪
命若聲啞口乾脚手俱腫十死八九可不慎哉宜服
二州散五疳丸三黃丸

二州散

龍膽州

甘州

當歸各一錢

細辛一分

右研細末每服一錢水一盞煎五分入白砂糖三

匙食後溫服

五疳丸 專治小兒疳眼面瘦色黃羸弱怕日食乳

不消

綠礬成塊

蜜陀僧過夜明砂各二錢


共研細末蒸棗肉搗爛入末為丸如黍米大每

服三四十丸量兒大小空心米湯送下

三黃丸 方載前經肉攀睛外障條

每日服三次為佳

胎風赤爛外障



胎風赤爛者其症有三初生時血露入
 眼洗不乾淨而生是疾遂至赤爛又有
 在母腹中其母不知忌口多食壅毒之
 物酒麪五辛之類至產三四箇月兩眼
 雙赤眵粘四眦皆紅赤濕爛此卽是胎毒
 所致蓋小兒在母腹中飲母血血毒於
 兒生出則發此症又有乳母壯盛之人
 抱兒供兒之際口沫哺乳頭乳汁脹滿
 洒然射出衝入兒眼亦能生出濕爛若
 衝射面亦或成疔濕癢大抵此三症同

號曰胎風赤爛血露不乾與乳汁衝射宜碧天丹
洗胎毒致新須母服三黃丸忌口及黃芪飲其小兒
亦用三黃煎湯薰洗點以時藥或煎黃連側柏葉薰
洗宜服黃芪飲正料消風散三黃丸洗宜湯泡散

黃芪飲

黃芪

車前子

細辛

黃芩

五味子

右白朮煎食後服

正料消風散

川芎

白朮

其艸

防風

荆芥

羌活

姜蚕

蟬脫

厚朴

人參

合香

右向水煎服


三黃丸 方載翕努肉攀睛外障條下

湯泡散 當歸 赤芍 黃連 杏仁

薄荷 防風 銅綠

右用水煎沸湯泡洗眼効

久年爛弦風外障



久年爛弦風者因脾胃壅熱久受風濕
更加食諸般物月積月累致成風爛胞
臉之內變生風症動作發痒用手拂拭
甚則連眼眶皆爛無分春夏秋冬皆如
是候出滿眼有不可近人之狀治法翻

轉臉胞剝洗瘀血二三度用小鋒針出瘀血亦可
若用摩引有紅腫紅筋宜用老酸醋煮爐石碎七
次加以丹藥量輕重搽點眼眩或吹入眼內無妨宜
忌口動風動血之物切勿食宜服蟬花無比散神効
明目湯洗宜碧天丹金錢湯

蟬花無比散

蟬蛻去土

蛇蛻炒各五錢

羌活

石決明

煅米當歸

川芎各一

蒼朮

防風

赤芍

白茯苓

甘草各二錢

白蒺藜炒去刺

右研細末每服三錢食後米泔水調服

補効明目湯

黃連

黃芩

乾葛各

蔓荊子

防風

甘州各四

細辛分

右水煎加葱一莖同煎臨臥熱服

碧天丹

方載後洗眼要藥條下

金錢湯

亦載後洗眼要藥條下

俱用清晨或晚以絹帕沐洗

眼科秘傳全書卷之五

秘傳眼科全書卷之六

諸症湯散丸藥類

洗肝散

治眉稜角眼眵骨痛不可忍者

當歸

薄荷

羌活

梔仁

大黃

防風

甘艸

川芎

加膽艸生地

水煎食後服

一陳湯

陳皮

半夏

白茯苓

甘艸

連翹

防風

黃芩

蒼朮

皂角刺酒炒

選奇方

治眉稜角痛甚者

防風

羌活

黃芩

甘艸各錢

水煎食後溫服

防風羌活湯 治眉稜角痛而風寒痰濕者

防風

羌活

細辛

黃芩

白芷

南星

半夏

白朮

藁本

甘草

右等分為末每服四錢水煎溫服

黃芩白芷散 治眉稜風熱痛

黃芩

酒炒

白芷

研為細末食後臨卧清茶調下

眉稜角痛論

丹溪曰眉稜角痛屬風熱與痰類痛風作風痰治

或云眉角痛者有二眼屬肝有肝虛而痛纔見光明則眉角痛甚宜服生地黃丸有眉稜痛目不能開目靜夜劇者宜服導痰丸之類入芎藭茶二陳湯吞或青川白丸子亦効

點按眉稜角痛者多是肝火上升怒氣甚者有此疾其謂風症亦火之所致熱甚生風是也大抵抑肝火有風痰則兼治之

二烏散

川烏

州烏

俱用薑便
洗炒去毒

細辛

羌活

黃芩

甘草

等分爲細末每服二錢清茶調下

洗心散

治心經積熱四皆赤痛古方

當歸

赤芍

麻黃

大黃

白朮

薄荷

甘草

荆芥穗

水煎服

防風通聖散

治時行暴熱風腫火眼腫痛難開或

頭面俱腫

防風

大黃

赤芍

薄荷

川芎

甘草

朴硝

梔子

連翹

桔梗

黃芩

白朮

麻黃

荆芥

滑石

石膏

歸須

右用水煎食後服

明目清涼飲 治一切熱目痛淚羞明

歸鬚 赤芍 川芎 蔓荊子 黃連

連翹 防風 荊芥 生地 柴胡

龍艸各六分 桔梗 蟬蛻 薄荷 耳艸各三分

右水煎食後臨臥服

萬應蟬花散 治一切目疾移多怕風上焦有邪熱

蟬蛻 蛇蛻各三分 歸鬚 赤芍 川芎

防風 羌活 蒼朮 耳艸各一分 白朮各一分

石決明煨五錢

右研細末每服二錢食後臨臥米飲調下

當歸養榮湯 治睛珠痛甚血少枯澀

當歸 赤芍 川芎 白芷 熟地

防風 羌活

水煎食後服

本事菊花散 治肝腎風毒上衝眼痛

菊花 牛蒡子炒 防風各二兩 白蒺藜 甘艸各一兩

右研細末每服二錢食後臨臥熱湯調下

桑白皮散 治風氣壅塞熱毒攻睛白腫脹日夜疼痛

桑白 杏仁去皮尖 玄參 枳殼 防風

升麻 赤芍 旋伏花 甘菊 黃芩

其州

華蓋

右等分爲末每服五錢同姜三片水煎食後溫服

四物龍膽湯

治目痛暴作雲翳痛不可忍

當歸

川芎

白芍

生地

防已

防風

膽州

羌活

右水煎食後溫服

當歸龍膽湯

治眼中白翳

當歸

膽州

赤芍

黃芩

黃柏

黃芪

其州

黃連

柴胡

防風

羌活

五味子

升麻

石膏各三

右水煎起碗用酒一盃熱服

開明散

治風毒攻眼膜澁膜脹通用

川芎

防風

羌活

蒺藜

天麻

白朮

蟬退各五分

蒼朮各五分

細辛

荊芥

羌活充

甘州各三

甘菊錢一

研為細末每服二錢用溫水一盃食後沸湯調下

寫白陽

治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

歸鬚

赤芍

生地

黃芩

梔子各等分

加桑白菊花青柏子防風蒺藜連翹木賊

右研為末每服三錢水煎服

前胡犀角湯

治傷寒熱病後兩目昏暗或生浮翳

前胡

犀角屑

防風

蔓荊子

梔子仁

麥門冬

去心

生地

酒洗

青相子

隔紙炒

羌活

菊華

州決明

車前子

細辛

黃芩

甘草

炙各五分

右水煎食後服

甘菊湯

治一切眼疾

甘菊

旋伏花

石決明

升麻

川芎

大黃

酒洗

木賊

車前子

黃連

黃芩

青相子

州決明

石膏

梔子

防風

荊芥穗

羌活

地骨皮

甘州

專為末每服三錢入蜜少許同煎食後臨臥溫服

清神益氣湯

治脾胃虛弱之人誤服洗肝散或服

寒涼過多而目愈病者

人參

白朮

白茯苓

甘州

麥門冬

五味

各五分

蒼朮

陳皮

升麻

赤芍

防風

黃柏

青皮

各一分

用姜三片水煎食後服

助陽活血湯

治腰無力常欲睡閉或痛痺

黃芪

炙

甘州

水浸

當歸

酒洗

蔓荊子

炒

升麻

酒洗

防風各五

白芷分四

柴胡分六

右水煎食後又熱服

石膏羌活散

治久患雙目不視光明遠近內外氣

障風昏倒睫拳毛一切眼疾

石膏

羌活

木賊

密蒙花

藜蘆

細辛

川芎

荆芥

甘菊

黃芩

藜蘆

甘州

白芷

乾菜子

麻子

右研細末每服一錢食後臨卧用蜜湯調下或

清湯亦可日進三服二十日後大有神効

蛤粉散

治小兒雀目至夜不見物

蛤粉

石決明

夜明砂

其州

右等分為細末，小兒三歲者，每服五錢，煮豬肝汁，晨後調服。

又雀目方

治大人小兒通用

蒼朮

為末

用羊肝一具，以竹刀切開，搗末，在內麻

線縛定，再將粟米泔水一大碗，煮熟，令患眼人

對瓶口薰之，藥氣略溫，即以肝及汁食，三五次

即効。

簡要補肝散

治肝虛目痛，眼淚不止，怕月，羞明目，

珠痛，肩稜角痛，及頭半邊腫痛。

夏枯艸

錢七 耳艸 錢二

香附

一兩重便浸透洗淨打碎且乾

右研細末每服一錢滾湯調下

排風湯

治兩臉粘睛

天麻

桔梗

防風

赤芍

五味子

陳皮

升麻

桑白

用水煎食後服

烏豆湯

治拳毛倒睫

烏豆

黃連

耳艸

密蒙花

大黃

朴硝

右用順取東流水煎服

止痛光明方

青桐子

密蒙花

龍膽州

耳菊花

地骨皮

白芍金

金鷄舌

天香露

酸鷄炭

右水煎食後服

偏肺湯

治白仁赤腫

桑白

大黃

條黃芩

白牽牛

黑牽牛

甘州

右水煎食後服

桑白散

治肺經熱白仁腫脹

桑白

杏仁

玄參

防風

升麻

赤芍

學藤

用水煎食後服

濟肝散

治眼淚常出

羌活

細辛

菊花

蒺藜

右研細末麥門冬煎湯調下

九仙丹

治眼通紅久不退

歸鬚

赤芍

川芎

黃芩

木通

肉苳

荊芥

菊花

甘肅

右水煎食後服

甘寶散

治大小背赤腫痛生肉翳者

歸鬚

赤芍

梔子

荆芥

麻黃

大黃

甘艸

一水煎食後服

傷肺散

桑白

葶藶子

玄參

旋伏花

地骨皮

桔梗

知母

黃柏

黃芩

菊花

朴硝

右水煎食後服

瀉肝散

郁李仁

荆芥

甘艸

梔子

右水煎食後服

除翳掃雲散

當歸

防風

梔子

薄荷

川芎

各二兩

大黃

二兩

甘草

羌活

各二兩

木賊

玄精粉

各五錢

右研細末熱湯調下

谷精州

車治翳落後用

谷精州

防風

甘草

右研細末米飲調下

退血散

治眼睛疼痛腫者

歸鬚

赤芍

木賊

細辛

龍腦

右研細末每服四錢溫湯調下

蒼朮散

治風目

蒼朮

桑螵

蟬蛻

川芎

防風

荊芥

蔓荊子

白芷

夏枯草

甘草

石研細末清茶調下

撥雲遮翳丸

消膜

當歸

川芎

羌活

青柏子

車前子

石決明

地骨皮

黃連

蒺藜

知母

枳殼

各一

蔓荊子

石南藤

穀精草

密蒙花

荊芥

薄荷

木賊

菊花

瓜蒌子

烏藥

各六

甘草

川椒

蟬蛻

石燕

石燕

各三

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十九食後飲湯下

退翳復明丸

人參錢五 枸杞子 防風

蕪荊炒去 兔絲子錢五 赤芍各二錢 青柏子 石斛各五

木賊 密蒙花 石決明煨 熟地黃 白芍

玄參各二錢 蟬蛻 薄荷各二錢 伸決明炒 其菊各五錢

夜明砂錢三 羚羊角 犀角各二錢

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十九食

後白湯下

羊肝丸 治肝虛風熱冷淚赤腫丹外障服

黃連三

當歸三

熟地三

枸杞子

菊花明

石決明煨

龍膽州

防風

牛膝

麥門冬

羌活

黃柏

柴胡各一

人參三

青蘄七

肉桂三

羯羊肝一具

煨乾

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸或

湯或酒下

石斛夜光丸

治神水散大昏如霧露眼前常見黑

花視一或二久則光不攸歛及內障神水淡白綠

色七

人參三

枸杞子

鬼絲子三

當歸三

熟地三

石斛州

夜明沙洗

川芎

青柏子

枳殼

白朮

生地黃

茯苓

麥門冬

肉苁蓉

神決明

天門冬

防風

黃連

牛膝

乾山藥

杏仁

家菊

五味子

甘州

犀角

羚羊角

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四五十丸

酒飲下或湯下

加減三花五子丸

治五臟風熱上攻肝虛頭痛眼

見飛花或生翳障並皆治之

菊花

密蒙花

旋伏花

荊芥

夏枯草

升麻

木賊

枸杞子

兔絲子

歸鬚

青相子

黃芩

連翹

白朮去九

石解州

羌活

藜蘆

黃柏

知母去九

防風

白芷

各一兩

州決明

炒

石決明

煨

蔓荊子

地膚子

各一兩

其艸

六分

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十丸

湯下或酒下

地膚子丸

伯青不見物

地膚子

燒

白藜蘆炒青相子

克蔚子

防風

兜絲子

酒浸一宿

車前子

酒浸炒

大黃

炒

蟬蛻

去九

細辛

黃連

各一兩

右研細末煉蜜為丸如梧子大每二十丸溫酒

送下

夜光柳紅丸

治諸般風毒眼生翳膜

人參五錢

當歸酒洗

川芎

防風

荊芥

薄荷

細辛

白芷

蒼朮米泔浸日乾

南星

石膏

蕪本

蒲黃

藿香

耳松

全蝎酒洗

川烏大者

州烏美陽池云皮天後酒

何首烏五錢

羌活五錢

雄黃一兩

右研細末煉蜜為丸如梧子大雄黃為衣每二

十丸情茶下

清涼丸

治小兒癰瘡入眼宜服

人參

白茯苓各五錢

防風

黃芩

克蔚子

大黃

玄參各二兩

右研細末煉蜜為丸梧子大二十九空心清茶送下

送下

三黃隔心丸

治肝熱

黃連

黃芩

黃柏炙過各二兩

加大黃三兩

右研細末煉蜜為丸梧子大每二三十九淡竹葉煎湯下

葉煎湯下

小補陰丸

黃柏

知母各八錢

加夜明砂五錢一兩

為衣期平
不須加砂

右研細末レ流水チ為丸ト梧子大每三十丸ニ清茶下ニテ

涼膽丸 治眼昏花ラ

黃連 黃柏 地膚子 龍膽州 防風

荆芥 姜蠶

右研細末レ煉蜜ミテ為丸ト如綠豆大每六十丸ニ薄荷

湯下ス

椒黃丸 治上盛下虛レ內外障翳疼痛ヲ蓋明努肉ヲ退

時冷熱淚下上

川椒子 熟地黃各一兩

右研細末煉蜜為丸梧子大每三十丸溫米泔

水送下

乳香川烏丸 治一切冷淚

乳香錢一 川烏去毒 艸烏去毒 白礬錢一 白酒麴塊

右研細末用雄豬膽汁和丸如粟米大每用一

丸夜臥時放於大背止候神妙

點眼丹膏類

清涼丹 耳石製過 硼砂分 硃砂分 麝香

冰片分

右研極細末聽用

止候丹

耳石錢一分

硼砂五分

銅線一分

麝香八厘

冰片一分

右研極細末，聽用。

散血丹

耳石錢一分

硃砂

硼砂

辰砂各五分

麝香五厘

右研極細末，聽用。

止癢丹

耳石錢一分

銅線五分

青蘆二分

硼砂製過一分

右研極細末，用。

開膜丹

硼砂五分

硼砂

青蘆各一分

右研極細末，用。

去膜丹 點厚膜立効

其石二青 珍珠錢一 珊瑚 蘇仁各二 冰片分三

珠砂錢一 麝香 硃砂各二 硃砂錢一 膽礬

青蘊 銅綠各五 海螵蛸分八 黃丹五錢

右研極細末聽用

去翳膜丹 其石錢一 熊膽二錢入在青 珍珠分六

硃砂錢一 硼砂 石燕 石蠟用清水煮過各五分

銅綠分七

右研極細末聽用

八寶丹 點時起翳立効

耳石錢一

石燕

石蠟各一分

硃砂六分

礞砂四分

熊膽

珍珠

雞仁各一分

琥珀

麝香各二分

右研極細末聽用

止痛丹

甘石錢一

兒茶各一分

血竭各一分

麝香

冰片各一分

右研極細末用

紫金定子

點翳膜風熱俱効

耳石錢一

珍珠

瑪瑙

辰砂

硃砂各二分

冰片一分

輕粉五厘

右研極細末用製甘石藥水留清酌調定子攸

貯候用或重翳多和後天開丹同用

天開丹

耳石

熊膽

五分用黃連煎湯浸開入耳石內日乾

硃砂

硃砂

沒藥

各三分

珍珠

膽礬

青塩

硃砂

製過各二分

乳香

各二分

右研極細末收藏聽用但此丹其效最速不可輕舉須辨症加減如翳膜重厚者獨用此丹稍輕者當和煎紫金定子同用故膜初生而輕則少用天開多和定子或時久而重則多用天開少用定子臨期應變自量加減至神至効

白龍丹

點赤目後生翳膜

芒硝

硃砂

麝香

冰片各一分

右芒硝用白礬若許放於硝銀窩內用新瓦蓋
口炭火溶化傾於碗中凝成揀白玉色者取起
聽用併別藥同研細末

立消丹

點浮翳宿翳膜遮睛痛眼

食塩

雪白者尤好

置淨器中生研如塵以灯心蘸塩

輕手指定睛上點二三次即不痛

去老膜丹

硃砂

五分上下无命定
眼合文武火煨

巴豆

去油三使用
其水煮熟

龍骨

煨過

白丁香

此通各
三分

共研細末聽用

陰丹 點翳膜眼

甘石錢 珍珠

琥珀 瑪瑙

砌砂

熊膽 乳香

沒藥 青塩

膽礬

冰片 麝香各一分

食塩五厘

共研細末候用

陽丹 點翳膜眼

甘石錢 珍珠

瑪瑙 琥珀

熊膽

雄黃 乳香

沒藥各五分 麝香

冰片各一分

共研細末用

光明丹 點眼光明

甘石丁

珍珠

瑪瑙

雄黃

麝香

朱片

右研極細末聽用

八寶粧仁膏

點一切翳膜及風眼

甘石

熊膽

銅綠

石熱

石蠟各一

硃砂錢二

珍珠

粧仁各一

珊瑚分七

琥珀分六

麝香分五

冰片分二

黃丹製過

冬蜜分八

黃連分四

薄荷分二

右十三味共研細末用連荷二味煎湯熬蜜龍

眼肉色取起候冷加煎藥末為膏聽用

磨翳靈光膏 點一切障翳

甘石_{錢二} 硼砂_{錢二} 珍珠 熊膽 黃丹_{錢各}

石膏 石蠟 麝仁_{各五分} 硃砂_{錢二} 乳香

沒藥 雄黃_{各三分} 白冬蜜_{各六分} 黃連_{錢三} 薄荷_{錢二}

右研細末用連荷煎湯熬成龍眼肉色取起候冷加煎藥末為膏

碧雲膏 點雲翳

銅青_{分五} 輕粉 麝香_{各一分} 黃丹_{錢一}

右研細末煉蜜一兩加煎藥末為膏

長眷膏 照撞碎生翳膜眼亦除翳膜

生地黃汁 薄荷汁 冬青子汁

右三味汁熬濃加蜜一兩同熬成膏

勝金膏 治拳毛倒睫

阿膠

明者三片

冰片

五片

麝香

五片

右將阿膠用水煎濃成膏候冷下片麝取起以罐盛之每時々用手蘸膏抹倒睫臉上為妙

曾青膏 治爛弦風

銅綠

百藥煎

等分

右二味入鍋內煨研為細末用蜜調成膏貼臥少許抹在眼弦上以薄紙貼之來月即効

敷貼腫眼方

芙蓉葉

研末
二分 細茶 研末
一分

右煎細茶調二味為膏以紙托住貼于眼一宿其腫立退

又方

用豬腿精肉一片以大黃磨濃水浸肉溫煖

貼眼腫處立退

又方

用胡芭葉搗爛溫煖作餅貼眼其翳立退

摩頂膏

治眼眶疼或太陽疼及肩骨痛可摩可貼

木香

子鵝脂

牛脂

各一分

溫花

一錢五分

硃砂

錢一

龍腦

三分

右四味研為細末用鵝牛脂熬滾入末同熬成膏若軟再加黃蠟多寡用手蘸摩擦頭額諸痛處或作餅貼痛處俱効

搐鼻退翳方

單用州藥一名茅裏金釵以根搗爛搐鼻眼翳立消又方用州名鵝不食打爛搐鼻其翳立退

楊梅皮 躑躅花根 薄荷葉 白芷 粉州

細辛各等分 牙皂俱 麝香平

右研為末作丸搐鼻或吹入鼻孔能洗淚清上

雄黃散

治頭風痛不可忍者

雄黃

全蝎

薄荷

川芎

乳香

沒藥

牙硝

共研細末吹入鼻孔立効

縛手退翳方

苦膽菜 地薄荷

二味搗爛溫煖將手合掌向上以患眼合手天
府處敷藥縛住其患立消

又方

艸名蛇苞又名五瓜龍搗爛縛手天府穴或縛手

脉門患立退

又方

鵝不食艸亦可。纏天麻穴患立消。

洗眼丹藥類

洗眼要藥

梧子

秦皮

桑葉

槐枝

艾葉

冬青葉

五梧子

味苦性溫研末泡湯洗眼去風止淚

收爛眩風退翳

秦皮

煎湯洗眼去風毒除翳膜收爛眩風冷淚

桑葉 煎湯洗眼去風熱止淚除痔止痛明目

槐枝 煎湯洗眼去風止淚明目

艾葉 煎湯洗眼或用氣薰能去風攸爛眩風

止冷淚

冬青葉 煎湯洗眼去風熱攸眩風止冷淚

又方 不拘疼痛外障皆可洗

新鮮菊花或乾菊煎湯

又方 可洗紅腫

桑白 木賊 防風 歸鬚 黃連

側柏葉 生地

共煎湯濾清洗眼立効

又方

黃連

黃柏

側柏

歸須

赤芍

防風

荆芥

木賊

菊花

同煎濾清洗眼効

又方

黃連

黃柏

歸須

溜々金

同煎水洗

當歸飲

治淋痛痒羞明怕日

當歸

黃連

生地

熟地

鬱金

杏仁

桅子

黃柏

赤芍

分作二服水煎熱洗

鵬雪膏 專洗翳膜

大黃

黃連

秦皮

滑石

右各等分爲末每服一錢湯泡澄清洗眼明朗

又方 熏洗熱眼

當歸

赤芍

生地

蔓薺花

黃柏

黃連

紅華

谷精州

研末煎湯薰眼後微冷傾出洗眼

又方 專洗風眼

用薄荷煎湯同淡薄荷薑汁少許洗眼爲妙

又方 經冬桑葉煎湯及桑樹燒灰泡洗眼

開月期于后

正月初八

二月初十

三月初五

四月初八

五月初八

六月初七

七月初七

八月初三

九月初十

十月初九

十一月初十

十二月初二

又方

朴硝六錢煎湯澄清溫洗

開月期于後

正月初一

二月初八

三月初四

四月初五

五月初五

六月初四

七月初五

八月初一

九月初三

十月初三

十一月初六

十二月初五

製藥品類

製盧甘石法

甘石三兩

用黃連

兩二兩薄荷黃柏歸鬚

各一兩赤芍、荆芥、生地、茯苓、錢同煎湯，濾清，以大碗盛住，將甘石放於銀窠內，用瓦蓋定，以炭火煉如法，好取起，傾于煎藥湯內，若未溶者，再煉數次，俾于湯內取淨，細者澄底，日乾取用。

製黃丹法

黃丹

一

用黃連

一

薄荷

錢

同煎湯，濾

清，以黃丹飛過，取淨者，再澄底，取起，日乾，聽用。

製硃砂法

用銅歸

一

盛住，以

三黃湯

煮乾

製銅綠法

銅綠

一

用蜜濃調塗于磁碗上，以艾作

條燒，烟薰之，數次，黑色為度，取起，聽用，或乳汁浸

焙乾，亦可用。

秘傳眼科全書卷之六

大尾

夫眼目之書諸家之醫書全冊
內列耳鼻口眼之各門而眼疾
全部之書行世者絕無撰啓微
銀海精微二書身以故或人欲
鑒此書而乞和點然然而書中

清之文字之善誤不少略以
愚見補之仍疑後賢此去則
龍樹論至眼疾證候總不及
五藏冷熱虛實之要藥七十
二症圖說而來亦有瘡眼諸

症湯散丸藥點眼洗眼神驗丹
膏而眼科之大意備焉於是乎
和點以塞其責云

自享五季次戊辰孟春吉

旦青木芳菴書



眼科大全

全部六冊

明傳仁宇著

寛政三年辛
亥十一月

心齋橋通南久寶寺町

大坂書林

河内屋八兵衛